

דף מידע, ודרכי מניעה והתגוננות – יתוש נמר האסיאתי

עקיצות:

יתוש הנמר האסיאתי ידוע בישראל כגורם למטרדי עקיצות קשים לבני אדם, בעיקר בשעות היום מחוץ לבתים. בישראל לא ידוע על העברת מחלה על-ידי יתוש זה.

דרכי התפשטות:

נראה כי עיקר ההתפשטות של המין בעולם, היא באמצעות העברת ביצים ו/או זחלים במים שנקווים בתוך צמיגים משומשים.

ביולוגיה ומחזור חיים:

יתוש זה מתפתח היטב גם במכלים מעשי ידי אדם מסוגים שונים, כגון עציצים, אגרטלים וצמיגים.

הזחלים והגלמים חיים במים ונושמים אוויר אטמוספרי. היתושים הבוגרים ניכרים בגופם השחור, ובפספוס לבן אופייני על הרגלים ועל החזה. הבוגרים פעילים בעיקר ביום, ועוקצים בעיקר מחוץ לבית. טווח התעופה של היתושים הבוגרים קטן יחסית (עשרות עד מאות בודדות של מטרים), והם נשארים רוב הזמן בצמחייה בקרבת הקרקע. בקיץ הישראלי משך שרידותם היא כנראה נמוכה יחסית, רק כשבוע עד שבועיים.

הדברה משולבת של היתוש בישראל:

הדרך העיקרית להדביר את היתוש היא על-ידי ביצוע פעולות מניעה. רק במקרים מיוחדים, נדרש יישום של חומרי הדברה.

מניעה:

הימנעות מהשקיית ייתר בגינות, ריקון מים הקיימים בתחתיות עציצים, דליים, חביות, אגרטלים, ניקוז מים עומדים ממרזבים סתומים, לחורר כל צמיג שצובר מים.

ויטור:

גילוי, זיהוי ודיווח על יתושים בוגרים, יועיל למיפוי וקביעת תמונת מצב, שתשמש בסיס טוב לפעולה של כל הנוגעים בדבר.

שימוש בחומרי הדברה:

במקרים של נוכחות רבה מאוד של יתושים בוגרים, או בעת נוכחות רבה של זחלים בעת חשש להעברת מחלה. יתבצע על ידי מדביר מוסמך.

התגוננות אישית:

מריחת חומרים דוחי יתושים, עשויה להועיל בהפחתת מספר העקיצות, בעת שהייה מחוץ לבית.

